ヤリイカ *Heterololigo bleekeri*



地方名：みずいか

生態

①寿命：1 年
②成熟：12 月～翌年 5 月
③産卵期：12 月下旬～翌年 5 月
④産卵場：水深 100m 以浅の岩礁帯
⑤分布：九州から北海道までの日本列島沿岸、黄海全域と東シナ海東部海域
⑥生態：ふ化後、1 ヶ月程の浮遊生活を経て、水深 30m～40m 程度の海底へと生活の場を移し、その後、昇温と共に徐々に陸棚域まで移動する。




図　青森県におけるヤリイカの成長
出典：木下（1989）西水研研報，67，59-68.

主な漁業

底建網、小型定置、底びき網、光力利用敷網で漁獲。主漁期は 11 月～翌年 5 月。

漁獲の動向と水準

1960 年以降の統計では 1985 年に 543 トンと過去最低の漁獲量を記録後、増加に転じ、2,000 トン～4,000 トンで推移したが、2002 年に 1,200 トン台までに急激に落ち込んだ。その後は再び増加していたが、2009 年以降は再び減少に転じ 1,000 トン前後で推移しており、2024 年の漁獲量は 918 トンであった。

2024 年の漁獲水準は、漁獲量の最高値と最低値との間を 3 等分し、上から高位、中位、低位とすると、低位であった。




図　青森県におけるヤリイカの漁獲量及び漁獲金額の推移



トピックス

・青森県産業技術センター水産総合研究所では、毎年 12 月に青森県～北海道渡島地方～岩手県沿岸で漁獲されるヤリイカ冬季来遊群の漁況予測を行なっている。